

Januar 2014

Ludwig Kraus, Alexander Pabst, Elena Gomes de Matos & Daniela Piontek

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2012

**Tabellenband:
Prävalenz der Medikamenteneinnahme und medikamentenbezogener
Störungen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2012**

Zitierbar als:

Kraus, L., Pabst, A., Gomes de Matos, E. & Piontek, D. (2013). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2012. Tabellenband: Prävalenz der Medikamenteneinnahme und medikamentenbezogener Störungen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2012*. München: IFT Institut für Therapiefor-

IFT Institut für Therapiefor-
schung
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Registergericht München, HRB 46395

Geschäftsführung:
Prof. Dr. Gerhard Bühringer

Verwaltungsleitung:
Stefanie Filipp

Commerzbank AG
Kto.-Nr. 03 276 806 00
BLZ 700 800 00
IBAN: DE38 7008 0000 0327 6806 00
BIC: DRESDEFF700

Stadtsparkasse München
Kto.-Nr. 23 168 370
BLZ 701 500 00
IBAN: DE30 7015 0000 0023 1683 70
BIC: SSKMDEMXXX

Ust.-IdNr.: DE 129521698

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA) 2012. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der Studie findet sich in Kraus, Piontek, Pabst & Gomes de Matos (2013). Ergebnisse zur Prävalenz der Medikamenteneinnahme und medikamentenbezogener Störungen im Jahr 2012 sind für die Gesamtstichprobe in Pabst, Kraus, Gomes de Matos & Piontek (2013) dargestellt und diskutiert.

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Einnahmeprävalenz: Mindestens einmaliger Gebrauch verschiedener psychoaktiver Medikamente bezogen auf die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage vor der Befragung. Hinsichtlich der 30-Tage-Prävalenz wird zwischen mindestens wöchentlichem Gebrauch und täglichem Gebrauch unterschieden. Die Variable „mindestens 1 Medikament“ umfasst die Arzneimittelgruppen Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva und Neuroleptika.

Medikamentenabhängigkeit: Abhängigkeit von Schmerz-, Schlaf- bzw. Beruhigungsmitteln in den letzten 12 Monaten nach den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994), erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Abhängigkeit bei Erfüllung von mindestens drei der folgenden Kriterien im Zusammenhang mit dem Gebrauch einer Substanz: (1) Toleranzentwicklung, (2) Entzugssymptome, (3) Substanzgebrauch länger oder in größeren Mengen als beabsichtigt, (4) Kontrollminderung, (5) hoher Zeitaufwand für Beschaffung, Substanzgebrauch oder Erholung, (6) Einschränkung wichtiger Tätigkeiten, (7) fortgesetzter Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen.

Medikamentenmissbrauch: Missbrauch von Schmerz-, Schlaf- bzw. Beruhigungsmitteln in den letzten 12 Monaten nach den Kriterien des DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Missbrauch bei Erfüllung von mindestens einem der folgenden Kriterien im Zusammenhang mit dem Gebrauch einer Substanz, sofern keine gleichzeitige Abhängigkeit von derselben Substanz besteht: (1) erhebliche Probleme in Haushalt, Familie oder Schule, (2) Substanzgebrauch in gefährlichen Situationen, (3) Probleme mit dem Gesetz infolge des Substanzgebrauchs, (4) soziale und zwischenmenschliche Probleme.

Literatur

- American Psychiatric Association (1994). *DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Kraus, L., Piontek, D., Pabst, A. & Gomes de Matos, E. (2013). Studiendesign und Methodik des Epidemiologischen Suchtsurveys 2012. *SUCHT*, 59, 309-320.
- Pabst, A., Kraus, L., Piontek, D. & Gomes de Matos, E. (2013). Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. *SUCHT*, 59, 321-332.
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): a critical review. *Journal of Psychiatric Research*, 28, 57-84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonig A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2, 2/95*. München: Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2012 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: IIA5-2511DSM216). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Tabelle 1: Prävalenz der mindestens einmaligen Medikamenteneinnahme in den letzten 12 Monaten

	Altersgruppen							
	Gesamt	18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	9007¹⁾	434	689	878	1676	2300	2136	893
Schmerzmittel	61.9	60.2	65.4	65.5	68.4	66.7	56.1	46.3
Schlafmittel	5.5	3.0	3.5	4.7	4.0	5.8	6.9	8.1
Beruhigungsmittel	5.4	3.7	3.8	5.4	4.8	4.7	7.7	5.0
Anregungsmittel	0.9	1.5	1.7	1.8	1.2	0.6	0.7	0.1
Appetitzügler	0.4	0.6	0.3	0.7	0.2	0.7	0.3	0.3
Antidepressiva	6.2	1.6	2.1	3.6	5.1	7.3	9.5	5.8
Neuroleptika	1.4	0.9	0.3	1.3	0.8	1.3	2.4	1.5
Anabolika	0.7	0.4	1.9	1.1	1.0	0.3	0.4	0.7
Mindestens 1 Medikament ²⁾	65.1	61.4	67.4	67.2	70.6	69.8	60.6	51.6
Männer	4561	223	351	448	862	1174	1066	437
Schmerzmittel	56.1	49.1	55.3	56.1	65.3	61.9	49.3	43.0
Schlafmittel	4.2	3.0	3.4	3.3	3.7	4.2	4.9	6.0
Beruhigungsmittel	4.6	3.1	2.9	5.5	4.8	4.2	5.8	3.6
Anregungsmittel	1.2	2.1	2.3	2.2	1.5	0.7	0.7	0.2
Appetitzügler	0.2	0.7	0.4	0.6	0.0	0.3	0.2	0.2
Antidepressiva	5.6	1.2	1.4	3.2	4.5	7.9	7.8	4.7
Neuroleptika	1.3	1.4	0.4	1.5	0.7	1.1	2.1	1.6
Anabolika	0.9	0.7	1.9	1.2	1.5	0.4	0.4	0.7
Mindestens 1 Medikament	59.0	50.7	57.7	57.3	67.8	65.0	53.3	46.2
Frauen	4446	212	338	430	814	1126	1070	456
Schmerzmittel	68.0	71.9	75.8	75.3	71.7	71.7	62.8	49.5
Schlafmittel	6.8	2.9	3.6	6.2	4.3	7.4	8.8	10.2
Beruhigungsmittel	6.2	4.5	4.7	5.3	4.7	5.2	9.6	6.4
Anregungsmittel	0.7	0.8	1.1	1.3	0.8	0.5	0.6	0.1
Appetitzügler	0.6	0.5	0.3	0.9	0.4	1.1	0.5	0.4
Antidepressiva	6.9	2.0	2.9	4.0	5.7	6.7	11.2	7.0
Neuroleptika	1.5	0.3	0.3	1.0	1.0	1.5	2.6	1.4
Anabolika	0.6	0.2	1.8	1.0	0.5	0.3	0.4	0.6
Mindestens 1 Medikament	71.4	72.7	77.5	77.6	73.6	74.8	67.8	56.7

¹⁾ Ungewichtete Anzahl der Fälle bezogen auf den Anteil an der Gesamtstichprobe mit validen Angaben auf mindestens einer der aufgeführten Substanzen.

²⁾ Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 2: Prävalenz der mindestens wöchentlichen Medikamenteneinnahme in den letzten 30 Tagen

	Altersgruppen							
	Gesamt	18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	9051¹⁾	436	692	879	1676	2312	2156	900
Schmerzmittel	18.5	12.6	13.0	13.5	18.8	20.4	21.0	18.6
Schlafmittel	2.4	1.3	0.8	1.7	1.5	2.3	3.8	3.6
Beruhigungsmittel	2.7	1.2	1.2	1.6	2.1	2.5	4.5	2.6
Anregungsmittel	0.5	0.6	1.0	0.6	0.9	0.3	0.4	0.1
Appetitzügler	0.2	0.4	0.3	0.3	0.0	0.2	0.3	0.1
Antidepressiva	4.8	1.2	1.4	2.3	4.0	5.4	7.9	4.5
Neuroleptika	1.1	0.8	0.2	0.9	0.7	0.9	1.9	1.2
Anabolika	0.4	0.4	0.6	0.0	0.7	0.3	0.6	0.2
Mindestens 1 Medikament ²⁾	23.3	14.2	15.4	17.1	23.2	25.5	27.4	24.7
Männer	4597	225	354	448	862	1183	1083	441
Schmerzmittel	16.3	8.9	13.2	11.8	16.9	17.0	19.1	17.2
Schlafmittel	1.8	1.8	1.2	0.7	1.7	1.7	2.2	2.3
Beruhigungsmittel	2.4	1.6	1.0	2.7	2.7	2.4	3.1	1.7
Anregungsmittel	0.7	0.6	1.6	1.0	1.1	0.4	0.4	0.2
Appetitzügler	0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2
Antidepressiva	4.3	1.1	0.9	1.8	3.8	6.1	6.0	3.1
Neuroleptika	1.0	1.4	0.2	0.9	0.5	1.0	1.7	1.1
Anabolika	0.6	0.8	1.3	0.0	1.3	0.0	0.9	0.4
Mindestens 1 Medikament	20.3	10.7	15.5	14.8	21.3	21.9	23.2	21.2
Frauen	4454	212	338	431	814	1129	1072	459
Schmerzmittel	20.7	16.4	12.9	15.4	20.8	24.1	22.9	20.0
Schlafmittel	3.1	0.7	0.4	2.8	1.3	2.9	5.4	4.9
Beruhigungsmittel	2.9	0.8	1.5	0.5	1.5	2.6	5.9	3.4
Anregungsmittel	0.3	0.6	0.3	0.2	0.6	0.1	0.5	0.1
Appetitzügler	0.2	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.0
Antidepressiva	5.4	1.4	1.9	2.8	4.3	4.7	9.7	6.0
Neuroleptika	1.1	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	2.2	1.3
Anabolika	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	0.0
Mindestens 1 Medikament	26.4	17.9	15.2	19.4	25.2	29.3	31.6	28.0

¹⁾ Ungewichtete Anzahl der Fälle bezogen auf den Anteil an der Gesamtstichprobe mit validen Angaben auf mindestens einer der aufgeführten Substanzen.

²⁾ Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 3: Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme in den letzten 30 Tagen

	Altersgruppen							
	Gesamt	18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	9051¹⁾	436	692	879	1676	2312	2156	900
Schmerzmittel	4.2	2.0	0.7	2.5	2.8	4.7	6.3	6.1
Schlafmittel	0.8	0.7	0.4	0.7	0.3	0.8	1.1	1.2
Beruhigungsmittel	1.2	0.4	0.3	1.0	0.6	1.1	2.2	1.5
Anregungsmittel	0.3	0.5	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1
Appetitzügler	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
Antidepressiva	4.2	1.1	1.2	1.7	3.3	4.8	7.2	4.1
Neuroleptika	1.0	0.8	0.2	0.9	0.7	0.9	1.8	1.2
Anabolika	0.2	0.4	0.5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
Mindestens 1 Medikament ²⁾	9.2	3.6	2.6	6.1	6.8	10.3	13.9	10.7
Männer	4597	225	354	448	862	1183	1083	441
Schmerzmittel	3.8	1.8	0.8	3.5	2.8	4.3	4.8	5.7
Schlafmittel	0.7	1.2	0.6	0.5	0.4	0.7	0.8	1.0
Beruhigungsmittel	1.1	0.5	0.6	1.9	1.0	0.8	1.3	1.2
Anregungsmittel	0.3	0.6	0.9	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2
Appetitzügler	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2
Antidepressiva	3.6	0.8	0.9	1.2	2.7	5.1	5.3	2.9
Neuroleptika	1.0	1.4	0.2	0.9	0.5	0.9	1.7	1.1
Anabolika	0.2	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2
Mindestens 1 Medikament	8.0	3.2	2.7	6.8	6.0	9.7	10.5	9.7
Frauen	4454	212	338	431	814	1129	1072	459
Schmerzmittel	4.6	2.2	0.6	1.4	2.8	5.1	7.9	6.6
Schlafmittel	0.8	0.1	0.1	0.9	0.3	0.9	1.4	1.4
Beruhigungsmittel	1.3	0.2	0.0	0.0	0.2	1.4	3.0	1.8
Anregungsmittel	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	0.4	0.1
Appetitzügler	0.1	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0
Antidepressiva	4.9	1.4	1.4	2.3	3.8	4.4	9.1	5.2
Neuroleptika	1.1	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	2.0	1.3
Anabolika	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0
Mindestens 1 Medikament	10.4	4.1	2.5	5.4	7.6	11.0	17.2	11.6

¹⁾ Ungewichtete Anzahl der Fälle bezogen auf den Anteil an der Gesamtstichprobe mit validen Angaben auf mindestens einer der aufgeführten Substanzen.

²⁾ Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 4: Schmerzmittelbezogene Störungen nach DSM-IV (Gesamtstichprobe)

	Gesamt	Altersgruppen						
		18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	8908	1131	979	882	1373	1623	1854	1066
Missbrauch	8.7 (725)	6.9	9.4	10.5	11.8	9.1	6.7	5.2
Abhängigkeit	3.4 (248)	2.1	1.9	1.9	3.0	4.5	4.0	2.6
Missbr. od. Abhängigkeit	12.1 (973)	9.0	11.3	12.4	14.8	13.6	10.7	7.8
Männer	3844	541	433	363	508	704	807	488
Missbrauch	8.5 (272)	4.7	8.4	9.6	12.7	9.1	6.5	4.9
Abhängigkeit	3.0 (89)	1.5	1.2	2.3	2.5	3.6	4.3	2.5
Missbr. od. Abhängigkeit	11.6 (361)	6.2	9.6	12.0	15.2	12.7	10.7	7.5
Frauen	5064	590	546	519	865	919	1047	578
Missbrauch	8.8 (453)	9.3	10.5	11.4	10.9	9.1	6.9	5.4
Abhängigkeit	3.7 (159)	2.6	2.6	1.6	3.6	5.5	3.8	2.6
Missbr. od. Abhängigkeit	12.6 (612)	11.9	13.1	13.0	14.5	14.7	10.7	8.0

Tabelle 5: Schmerzmittelbezogene Störungen nach DSM-IV (Konsumenten)

	Gesamt	Altersgruppen						
		18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	5481	699	642	594	941	1085	1039	481
Missbrauch	14.2 (725)	11.6	14.5	16.2	17.5	13.7	12.0	11.3
Abhängigkeit	5.5 (248)	3.4	2.9	3.0	4.5	6.9	7.3	5.6
Missbr. od. Abhängigkeit	19.7 (973)	15.0	17.4	19.2	22.0	20.6	19.3	16.9
Männer	2022	269	233	199	317	421	389	194
Missbrauch	15.4 (272)	9.6	15.4	17.5	19.9	14.8	13.3	11.7
Abhängigkeit	5.5 (89)	3.1	2.2	4.2	3.9	5.9	8.8	6.0
Missbr. od. Abhängigkeit	21.0 (361)	12.8	17.6	21.8	23.8	20.7	22.2	17.8
Frauen	3459	430	409	395	624	664	650	287
Missbrauch	13.1 (453)	13.0	13.9	15.3	15.3	12.8	11.0	11.0
Abhängigkeit	5.5 (159)	3.7	3.5	2.1	5.0	7.8	6.1	5.3
Missbr. od. Abhängigkeit	18.7 (612)	16.7	17.4	17.4	20.4	20.6	17.2	16.5

Tabelle 6: Schlafmittelbezogene Störungen nach DSM-IV (Gesamtstichprobe)

	Gesamt		Altersgruppen						
			18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	8991		1136	986	891	1395	1641	1869	1073
Missbrauch	0.8	(62)	0.4	0.4	1.1	0.5	0.8	1.2	0.5
Abhängigkeit	0.8	(53)	0.5	0.8	0.7	1.0	1.0	0.9	0.2
Missbr. od. Abhängigkeit	1.6	(115)	0.9	1.2	1.8	1.5	1.8	2.1	0.7
Männer	3879		541	435	365	520	714	815	489
Missbrauch	0.8	(24)	0.2	0.6	1.4	0.4	0.9	1.4	0.0
Abhängigkeit	0.8	(23)	1.0	0.6	0.2	1.3	1.0	0.7	0.3
Missbr. od. Abhängigkeit	1.6	(47)	1.2	1.2	1.6	1.7	2.0	2.0	0.3
Frauen	5112		595	551	526	875	927	1054	584
Missbrauch	0.8	(38)	0.6	0.3	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9
Abhängigkeit	0.9	(30)	0.1	0.9	1.2	0.7	1.0	1.2	0.2
Missbr. od. Abhängigkeit	1.6	(68)	0.7	1.2	2.0	1.3	1.7	2.1	1.1

Tabelle 7: Schlafmittelbezogene Störungen nach DSM-IV (Konsumenten)

	Gesamt		Altersgruppen						
			18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	463		31	32	36	60	86	134	84
Missbrauch	14.8	(62)	14.6	12.4	25.9	13.6	14.8	17.3	5.9
Abhängigkeit	15.3	(53)	19.3	22.4	15.7	25.1	17.5	13.3	3.1
Missbr. od. Abhängigkeit	30.1	(115)	33.9	34.8	41.6	38.7	32.3	30.6	9.0
Männer	148		14	13	8	22	26	43	22
Missbrauch	20.1	(24)	8.6	16.6	51.1	11.1	22.2	28.2	0.0
Abhängigkeit	19.6	(23)	31.8	18.6	7.7	35.6	24.7	13.4	4.5
Missbr. od. Abhängigkeit	39.8	(47)	42.6	35.3	58.8	46.8	47.5	41.6	4.5
Frauen	315		17	19	28	38	60	91	62
Missbrauch	11.5	(38)	21.4	7.9	13.8	15.8	10.4	11.1	9.3
Abhängigkeit	12.6	(30)	4.1	26.1	19.4	15.4	13.1	13.3	2.3
Missbr. od. Abhängigkeit	24.4	(68)	25.4	35.9	33.6	31.2	23.4	24.8	11.7

Tabelle 8: Beruhigungsmittelbezogene Störungen nach DSM-IV (Gesamtstichprobe)

	Gesamt		Altersgruppen						
			18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	8986		1138	986	890	1394	1641	1864	1073
Missbrauch	0.8	(57)	0.2	0.7	1.6	0.6	0.7	0.9	0.6
Abhängigkeit	1.4	(81)	0.5	0.6	0.5	1.2	1.8	2.0	0.8
Missbr. od. Abhängigkeit	2.2	(138)	0.7	1.3	2.1	1.8	2.5	2.9	1.4
Männer	3878		541	435	366	520	714	813	489
Missbrauch	0.8	(22)	0.2	1.3	1.9	0.3	0.6	0.9	0.4
Abhängigkeit	1.4	(31)	0.9	0.0	0.9	1.8	1.9	1.6	0.5
Missbr. od. Abhängigkeit	2.1	(53)	1.1	1.3	2.8	2.0	2.5	2.5	0.9
Frauen	5108		597	551	524	874	927	1051	584
Missbrauch	0.8	(35)	0.2	0.1	1.2	0.9	0.7	0.8	0.7
Abhängigkeit	1.3	(50)	0.1	1.3	0.2	0.5	1.6	2.5	1.0
Missbr. od. Abhängigkeit	2.1	(85)	0.4	1.5	1.4	1.5	2.4	3.3	1.8

Tabelle 9: Beruhigungsmittelbezogene Störungen nach DSM-IV (Konsumenten)

	Gesamt		Altersgruppen						
			18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
Gesamt	410		42	32	40	59	61	119	57
Missbrauch	14.8	(57)	6.3	19.8	32.8	12.9	14.7	12.0	11.4
Abhängigkeit	26.1	(81)	13.4	17.1	10.8	25.2	38.8	27.9	15.7
Missbr. od. Abhängigkeit	40.9	(138)	19.7	36.9	43.6	38.1	53.5	39.9	27.1
Männer	143		13	12	15	21	24	39	19
Missbrauch	17.1	(22)	8.0	45.9	38.7	5.8	14.9	16.0	11.4
Abhängigkeit	30.7	(31)	27.8	0.0	17.4	38.0	45.5	28.2	14.4
Missbr. od. Abhängigkeit	48.0	(53)	35.7	45.9	56.1	43.8	61.4	44.2	25.8
Frauen	267		29	20	25	38	37	80	38
Missbrauch	13.0	(35)	5.0	3.2	26.3	20.3	14.5	9.4	11.4
Abhängigkeit	22.5	(50)	2.9	28.0	3.4	11.7	32.8	27.6	16.4
Missbr. od. Abhängigkeit	35.8	(85)	7.9	31.1	29.7	32.0	48.3	37.2	28.0