IFT Institut für Therapieforschung
Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19
olderbak@ift.de
www.ift.de
Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung
Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

10.03.2026

Dipl.-Stat. Regina Hollweck
Kilian Olk, M.Sc.
Prof. Dr. Eva Hoch
Dr. Sally Olderbak

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:
Trends des Konsums von Cannabis und illegalen Drogen in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024

Gefördert durch:

Bundesministerium für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Förderhinweis
Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf den Erhebungen des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2012 bis 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der aktuellen Studie (2024) sowie Ergebnisse zur Prävalenz des Konsums illegaler Drogen und der Hinweise auf problematischen Drogenkonsum im Jahr 2024 sind für die Gesamtstichprobe in Olderbak et al. (2025a) dargestellt und diskutiert. Ergänzend hierzu werden Schätzungen zum Fahren unter dem Einfluss von Cannabis in Deutschland im Jahr 2021 in Olderbak et al. (2025b) berichtet. Ergebnisse zum Querschnitt 2024 und Trendanalysen für Cannabis finden sich in Hoch et al. (2025). Langfristige Trends und Projektionen des (schweren) Cannabiskonsums in Deutschland von 1995 bis 2021 werden in Olderbak et al. (2024) dargestellt, während alters-, perioden- und kohortenspezifische Analysen des 12-Monats-Cannabiskonsums in Schöllner et al. (2025) untersucht werden. Ergänzend hierzu analysieren Eckhardt et al. (2025) die zeitliche Entwicklung des Cannabiskonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland und beschreiben aktuelle Präventionsmaßnahmen im Kontext der Teillegalisierung.

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Konsumprävalenz: Mindestens einmaliger Konsum verschiedener illegaler Drogen bezogen auf die Lebenszeit, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage vor der Befragung. Die Variable „irgendeine illegale Droge“ umfasst die Substanzen Amphetamine, Methamphetamine, MDMA (“Ecstasy”), LSD, Heroin/andere Opioide, Kokain/Crack, Ketamine, GHB/GBL/BDO (Liquid Ecstasy), Schnüffelstoffe, Neue psychoaktive Substanzen (NpS) und halluzinogene Pilze.

Problematischer Cannabiskonsum: Für den problematischen Konsum von illegalen Drogen wurden die Kriterien der vierten Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994)) auf Basis eines 12-monatigen Erhebungszeitraums herangezogen. Dieses Vorgehen wird in jeder zweiten Erhebungswelle angewendet (zuletzt 2012 und 2018). Erhoben wurde dieser mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Im DSM-IV wird zwischen den Diagnosen „Abhängigkeit“ und „Missbrauch“ unterschieden, wobei eine Abhängigkeit diagnostiziert wird, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens drei Abhängigkeitssymptome erfüllt sind. Für Missbrauch muss mindestens ein entsprechendes Missbrauchskriterium zutreffen.

Statistische Analyse: Die Unterschiede zwischen den Erhebungsjahren wurden mittels logistischer Regression unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen Alter, Geschlecht und Erhebungsmodus auf statistische Signifikanz überprüft. Das aktuelle Erhebungsjahr 2024 wurde hierbei als Referenzjahr herangezogen. Um Verzerrungen durch die disproportionale Ziehung der Stichprobe sowie der Nicht-teilnahme auszugleichen, wurden Gewichte angewendet. Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrgangsgruppen und Bildungsniveau gemäß Mikrozensus 2023 berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Anmerkung: Die für die Trendanalysen dargestellten Ergebnisse können teilweise von den in den jeweiligen Querschnittsauswertungen berichteten Prävalenzen abweichen. Dies liegt daran, dass für die Trendanalysen teilweise andere bzw. harmonisierte Variablen verwendet wurden, um eine Vergleichbarkeit mit den Erhebungen der Vorjahre sicherzustellen.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis
Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Zitiermöglichkeit:
Hollweck, R., Olk, K., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Trends des Konsums von Cannabis und illegalen Drogen in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024.* IFT Institut für Therapieforschung.
https://doi.org/10.5281/zenodo.18959277

Literatur

American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.; DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Eckhardt, S., Nitzsche, A., & Orth, B. (2025). *Cannabis use among adolescents and young adults in Germany: Study results and prevention measures offered by the Federal Institute of Public Health*. Journal of Health Monitoring, 10(3), 135–148. https://doi.org/10.25646/13458

Hoch, E., Krowartz, E.-M., Hollweck, R., Möckl, J., & Olderbak, S. (2025). Cannabiskonsum vor und nach der Teillegalisierung Erste Trends, Konsummuster und Motive. *Deutsches Ärzteblatt International*, *122*(23), 632–637. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0161

Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025a). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International, 122*(23), 625–631. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157

Olderbak, S., Möckl, J., Bergmann, H., Krowartz, E.-M., Preuss, U. W., & Hoch, E. (2025b). Estimates of driving under the influence of cannabis in Germany in 2021 before the partial legalization. *Sucht*, *71*(1), 31–38. https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000910

Olderbak, S., Möckl, J., Manthey, J., Lee, S., Rehm, J., Hoch, E., & Kraus, L. (2024). Trends and projection in the proportion of (heavy) cannabis use in Germany from 1995 to 2021. *Addiction*, *119*(2), 311–321. https://doi.org/10.1111/add.16356

Schöllner, N. S., Glos, A., Möckl, J., Krowartz, E. M., Hoch, E., & Olderbak, S. (2025). Age-period-cohort analysis of past 12-month cannabis use in Germany (1995-2021). *Addiction*, *120*(9), 1759–1769. https://doi.org/10.1111/add.70087

Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research, 28*, 57–84.

Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2 (2/95)*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tage-Prävalenz des Cannabiskonsums nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung) 6

Tabelle 2: Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tage-Prävalenz des Cannabiskonsums nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)....7

Tabelle 3: Trends auf Cannabisabhängigkeit und Cannabismissbrauch in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV[1)] bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Gesamtbevölkerung) (Prozent) 8

Tabelle 4: Trends auf Cannabismissbrauch und Cannabisabhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Konsumierende) (Prozent) 9

Tabelle 5: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)....10

Tabelle 6: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)....12

Tabelle 7: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)....14

Tabelle 8: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung) 16

Tabelle 9: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)....18

Tabelle 10: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)....20

Tabelle 11: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von Amphetamin nach DSM-IV[1)] (18- bis 64-Jährige), 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung) 22

Tabelle 12: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV[1)] (18- bis 64-Jährige), 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung)....23

Tabelle 14: Trends des Missbrauchs und der Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV[1)] (18- bis 64-Jährige), 2012-2024 (Prozent) (Konsumierende)....25

Tabelle 1: Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tage-Prävalenz des Cannabiskonsums nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	**Erhebungsjahr**				
		2012	**2015**	**2018**	**2021**	**2024**
Lebenszeit-prävalenz	**Gesamt (n)**	**9052**	**9159**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	23,2*	27,2	28,3	34,7*	31,6
	18-24	27,8*	33,8	40,6*	40,1	37,1
	25-39	37,3	40,5	41,0	47,9*	42,9
	40-59	17,0*	21,0*	20,9*	29,4*	26,7
	60-64	7,7*	11,6	10,1*	14,0	15,0
12-Monats-Prävalenz	**Gesamt (n)**	**9056**	**9200**	**9267**	**8984**	**7508**
	18-64	4,5*	6,1*	7,1*	8,8	9,7
	18-24	14,7*	19,5	23,6	22,8	21,6
	25-39	7,1*	7,9*	9,9*	12,3	13,5
	40-59	1,4*	2,9*	2,5*	4,6	5,5
	60-64	0,1*	0,4*	0,4*	1,6*	3,8
30-Tage-Prävalenz	**Gesamt (n)**	**9055**	**9199**	**9266**	**8975**	**7506**
	18-64	2,3*	3,1*	3,0*	4,3	5,1
	18-24	6,8*	9,4	10,4	10,5	9,1
	25-39	3,5*	4,1*	4,0*	6,0	7,2
	40-59	0,9*	1,5*	1,0*	2,3	3,2
	60-64	0,0	0,4*	0,2*	1,1*	2,7

Tabelle 2: Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tage-Prävalenz des Cannabiskonsums nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht		Erhebungsjahr				
			2012	**2015**	**2018**	**2021**	**2024**
Lebenszeit-prävalenz	**Gesamt**	*n*	9052	9159	9267	8995	7508
		%	23,2*	27,2	28,2	34,7*	31,6
	Männer	*n*	3917	4100	4181	3899	3223
		%	27,5*	31,8	32,9	38,9*	36,1
	Frauen	*n*	5135	5059	5086	5083	4251
		%	18,6*	22,6	23,4	30,2*	26,9
12-Monats-Prävalenz	**Gesamt**	*n*	9056	9200	9267	8984	7508
		%	4,5*	6,1*	7,1*	8,8	9,7
	Männer	*n*	3918	4114	4180	3893	3221
		%	6,0*	7,4*	8,9*	10,7	12,3
	Frauen	*n*	5138	5086	5086	5074	4251
		%	3,0*	4,9	5,3	6,8	7,0
30-Tage-Prävalenz	**Gesamt**	*n*	9055	9199	9266	8975	7506
		%	2,3*	3,1*	3,0*	4,3	5,1
	Männer	*n*	3918	4113	4180	3893	3221
		%	3,3*	4,0*	3,8*	5,7	6,7
	Frauen	*n*	5137	5086	5086	5069	4251
		%	1,2*	2,3	2,1	2,9	3,3

Tabelle 3: Trends auf Cannabisabhängigkeit und Cannabismissbrauch in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV[1)] bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Gesamtbevölkerung) (Prozent)

			Erhebungsjahr		
			2012	**2018**	**2024**
Gesamt	**Cannabismissbrauch**	***n***	9054	9240	7425
		%	0,5	0,6	0,5
	Cannabisabhängigkeit	***n***	9053	9242	7427
		%	0,5*	0,6	1,0
Männer	**Cannabismissbrauch**	***n***	3917	4170	3186
		%	0,8	0,7	0,6
	Cannabisabhängigkeit	***n***	3917	4170	3189
		%	0,8	1,0	1,2
Frauen	**Cannabismissbrauch**	***n***	5137	5070	4205
		%	0,2	0,4	0,4
	Cannabisabhängigkeit	***n***	5136	5072	4204
		%	0,2	0,3	0,7

[1)] DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.
* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.
Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 4: Trends auf Cannabismissbrauch und Cannabisabhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Konsumierende) (Prozent)

			Erhebungsjahr		
			2012	**2018**	**2024**
Konsumierende	**Cannabismissbrauch**	***n***	502	882	810
		%	11,1*	8,0	6,0
	Cannabisabhängigkeit	***n***	501	884	812
		%	11,8	9,3	11,1
Konsumierende Männer	**Cannabismissbrauch**	***n***	300	506	446
		%	13,3*	8,6	5,6
	Cannabisabhängigkeit	***n***	300	506	449
		%	13,8	11,1	10,8
Konsumierende Frauen	**Cannabismissbrauch**	***n***	202	376	352
		%	6,4	7,0	6,4
	Cannabisabhängigkeit	***n***	201	378	351
		%	7,5	6,0	12,1

DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.
* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.
Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 5: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	Erhebungsjahr				
		2012	**2015**	**2018**	**2021**	**2024**
Irgendeine illegale Droge [1)]	**Gesamt**	**9062**	**9204**	**9267**	**9021**	**7508**
	18-64	6,92*	10,01*	9,62*	12,62	14,05
	18-24	6,59*	10,20	12,45	16,11	15,42
	25-39	12,01*	15,94	13,81	17,97	17,75
	40-59	4,87*	7,61*	7,32*	10,17*	13,03
	60-64	3,08*	4,42	4,55	4,24*	7,01
Amphetamin/ Methamphetamin	**Gesamt**	**8968**	**9198**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	3,12*	3,67	4,18	6,15*	5,15
	18-24	3,70	4,16	6,01*	7,39*	3,79
	25-39	5,80	6,89	7,14	8,75*	7,80
	40-59	1,82*	2,27*	2,59*	5,28*	4,80
	60-64	1,26	0,62	0,63	1,21	0,96
Amphetamin	**Gesamt**	**8968**	**9052**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	3,12*	3,62	4,08	6,06*	5,09
	18-24	3,70	3,98	5,96*	7,39*	3,79
	25-39	5,80	6,80	7,04	8,59*	7,75
	40-59	1,82*	2,25*	2,46*	5,19*	4,70
	60-64	1,26	0,64	0,63	1,21	0,96
Methamphetamin	**Gesamt**	**-**	**9143**	**9135**	**8995**	**7508**
	18-64	-	0,59	0,82*	1,16*	0,68
	18-24	-	1,10*	1,03*	0,68*	0,12
	25-39	-	0,95	1,59*	1,47*	0,91
	40-59	-	0,37	0,46	1,37*	0,86
	60-64	-	0,00	0,00	0,00	0,02
MDMA ("Ecstasy")	**Gesamt**	**8973**	**9044**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	2,71*	3,29	3,87	5,55*	5,16
	18-24	2,52*	3,61	5,68	7,82*	5,00
	25-39	6,61	7,11	6,33	8,33*	7,74
	40-59	0,99*	1,57*	2,65	4,33	4,65
	60-64	0,42*	0,30	0,13	0,47	0,55
LSD	**Gesamt**	**8970**	**9042**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	2,15*	2,61	2,10*	3,39	3,36
	18-24	0,98*	1,81	2,27	4,70	4,27
	25-39	4,26	3,13	2,90	3,97	3,99
	40-59	1,46*	2,52	1,70*	3,09	3,35
	60-64	1,11*	2,48	1,38*	1,61	0,91
Heroin und andere Opioide	**Gesamt**	**8956**	**9040**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	1,25*	1,45*	1,65*	1,76*	4,61

	18-24	0,69*	1,05*	1,81*	3,67	3,63
	25-39	2,14*	1,86*	2,06*	2,02*	3,58
	40-59	1,08*	1,46*	1,55*	1,41*	5,53
	60-64	0,33*	0,69*	0,72*	0,45*	4,91
Kokain/Crack	**Gesamt**	**8976**	**9050**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	3,40*	4,02	4,11	5,57*	5,29
	18-24	2,47	3,13	3,50	5,74*	3,81
	25-39	7,02	6,76	6,55	7,92*	7,22
	40-59	2,12*	3,22*	3,43	5,05*	5,55
	60-64	0,67	1,13	0,79	1,03	0,87
Neue psychoaktive Substanzen (NpS)	**Gesamt**	**-**	**9184**	**9266**	**9001**	**7508**
	18-64	-	2,79*	2,59*	3,96*	2,18
	18-24	-	4,16	5,14	6,55	5,2
	25-39	-	4,42	3,78	6,05	3,07
	40-59	-	1,8	1,54	2,6	1,3
	60-64	-	1,22	0,84	1,06	0,15
Inhalanzien	**Gesamt**	**9047**	**9185**	**9267**	**9010**	**7508**
	18-64	1,52*	1,27*	1,28*	2,03	2,76
	18-24	1,32	1,34	1,23	1,60	4,31
	25-39	2,21	2,03	2,20	2,67	4,24
	40-59	1,37	1,00	0,91	2,10	1,77
	60-64	0,57	0,29	0,34	0,46	1,02
Halluzinogene Pilze	**Gesamt**	**1085**	**948**	**959**	**936**	**859**
	18-64	2,60	3,10	2,99	4,50*	3,73
	18-24	2,43	2,84	3,01	4,45	4,12
	25-39	5,66	5,26	5,10	6,53	5,56
	40-59	1,34	2,41	2,10	4,04	3,21
	60-64	0,39	0,63	0,93	0,87	0,55

[1)] MDMA (“Ecstasy”), Amphetamine, Methamphetamin, Kokain, Crack, LSD, halluzinogene Pilze, Schnüffelstoffe, Heroin, andere Opioide, NpS

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 6: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	**Erhebungsjahr**				
		2012	**2015**	**2018**	**2021**	**2024**
Irgendeine illegale Droge [1)]	***n***	**9062**	**9204**	**9267**	**9021**	**7508**
	Gesamt	6,92*	10,01*	9,62*	12,62	14,05
	Männer	8,52*	11,56*	11,10*	15,22	16,39
	Frauen	5,26*	8,43	8,10	9,96	11,63
Amphetamin/ Methamphetamin	***n***	**8968**	**9198**	**9267**	**8995**	**7508**
	Gesamt	3,12*	3,67	4,18	6,15*	5,15
	Männer	4,40	4,49	5,20	7,83*	6,28
	Frauen	1,81*	2,84	3,13	4,44*	3,94
Amphetamin	***n***	**8968**	**9052**	**9267**	**8995**	**7508**
	Gesamt	3,12*	3,62	4,08	6,06*	5,09
	Männer	4,40	4,47	5,13	7,74*	6,28
	Frauen	1,81*	2,74	3,01	4,36*	3,82
Methamphetamin	***n***	**-**	**9143**	**9135**	**8995**	**7508**
	Gesamt	-	0,59	0,82*	1,16*	0,68
	Männer	-	0,69	1,01*	1,54*	0,69
	Frauen	-	0,49	0,63	0,78	0,63
MDMA (“Ecstasy”)	***n***	**8973**	**9044**	**9267**	**8995**	**7508**
	Gesamt	2,71*	3,29	3,87	5,55*	5,16
	Männer	3,62*	3,68	4,51	7,09*	6,12
	Frauen	1,78*	2,90	3,21	4,00	4,16
LSD	***n***	**8970**	**9042**	**9267**	**8995**	**7508**
	Gesamt	2,15*	2,61	2,10*	3,39	3,36
	Männer	3,01	3,45	2,63	4,78*	4,40
	Frauen	1,28*	1,74	1,55	1,97	2,24
Heroin und andere Opioide	***n***	**8956**	**9040**	**9267**	**8995**	**7508**
	Gesamt	1,25*	1,45*	1,65*	1,76*	4,61
	Männer	1,47*	1,74*	1,99*	2,07*	5,00
	Frauen	1,03*	1,15*	1,31*	1,45*	4,18
Kokain/Crack	***n***	**8976**	**9050**	**9267**	**8995**	**7508**
	Gesamt	3,40*	4,02	4,11	5,57*	5,29
	Männer	4,44	5,16	5,00	7,11*	6,66
	Frauen	2,33	2,85	3,19	4,01	3,84
Neue psychoaktive Substanzen (NpS)	***n***	-	9141	9267	8895	7508
	Gesamt	-	2,79*	2,59*	3,96*	2,18
	Männer	-	3,10*	3,13*	4,61*	2,92
	Frauen	-	2,48*	2,03*	3,31*	1,37
Inhalanzien	***n***	9046	9194	9267	8995	7508
	Gesamt	1,52*	1,27*	1,28*	2,03	2,76
	Männer	2,00*	1,74*	1,85*	2,78	3,61

	Frauen	1,03*	0,79*	0,70*	1,27	1,84
Halluzinogene Pilze	***n***	9046	9194	9267	8995	7508
	Gesamt	2,60	3,10	2,99	4,50*	3,73
	Männer	3,90	4,12	3,79	6,31*	4,88
	Frauen	1,26*	2,07	2,17	2,62	2,49

[1)] MDMA (“Ecstasy”), Amphetamine, Methamphetamin, Kokain, Crack, LSD, halluzinogene Pilze, Inhalanzien, Heroin, andere Opioide, NpS

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 7: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	**Erhebungsjahr**				
		2012	**2015**	**2018**	**2021**	**2024**
Irgendeine illegale Droge [1)]	**Gesamt**	**9062**	**9204**	**9267**	**9030**	**7508**
	18-64	1,60*	2,35	3,07	3,78	3,72
	18-24	3,06*	5,55	7,00	8,33	7,24
	25-39	3,00*	2,91*	4,41	5,37	5,15
	40-59	0,67*	1,53	1,65	2,16	2,32
	60-64	0,36	0,84	0,96	1,14	1,72
Amphetamin/ Methamphetamin	**Gesamt**	**9047**	**9201**	**9267**	**9008**	**7508**
	18-64	0,74	1,04*	1,22*	1,40*	0,74
	18-24	1,89	2,83*	3,17*	3,54*	1,63
	25-39	1,24	1,42	2,24*	2,14*	1,30
	40-59	0,31	0,57*	0,33	0,68*	0,29
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
Amphetamin	**Gesamt**	**9047**	**9185**	**9265**	**8997**	**7508**
	18-64	0,74	1,00*	1,20*	1,38*	0,74
	18-24	1,89	2,56*	3,18*	3,46*	1,63
	25-39	1,24	1,42	2,18*	2,10*	1,28
	40-59	0,31	0,57*	0,33	0,68*	0,29
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
Methamphetamin	**Gesamt**	**-**	**9164**	**9162**	**9008**	**7508**
	18-64	-	0,21*	0,21*	0,24*	0,04
	18-24	-	0,64	0,32	0,26	0,00
	25-39	-	0,13	0,34	0,35*	0,02
	40-59	-	0,19	0,14	0,21	0,07
	60-64	-	0,00	0,00	0,00	0,00
MDMA ("Ecstasy")	**Gesamt**	**9046**	**9181**	**9267**	**8995**	**7508**
	18-64	0,45*	0,64	1,07*	1,02	1,04
	18-24	0,77	2,09	3,24*	3,26*	1,97
	25-39	0,75*	0,68*	1,88	1,72	1,91
	40-59	0,29	0,39	0,23	0,21	0,46
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LSD	**Gesamt**	**9044**	**9178**	**9266**	**9000**	**7508**
	18-64	0,27*	0,27*	0,32	0,64	0,69
	18-24	0,42	0,61	0,89	2,45*	0,98
	25-39	0,53	0,13*	0,53	0,73	1,13
	40-59	0,15	0,32	0,08	0,25	0,43
	60-64	0,00	0,00	0,07	0,00	0,21
Heroin und andere Opioide	**Gesamt**	**9042**	**9180**	**9267**	**9010**	**7508**
	18-64	0,37*	0,33*	0,44	0,55	0,75

	18-24	0,18	0,37	0,85	1,01	0,36
	25-39	0,81	0,32*	0,50	0,71	0,93
	40-59	0,23*	0,38	0,34	0,43	0,67
	60-64	0,05	0,07	0,19	0,09	0,93
	Gesamt	**9044**	**9177**	**9267**	**9001**	**7508**
Kokain/Crack	18-64	0,78	0,63	1,11	1,57*	1,12
	18-24	1,04	1,53	1,74	3,48*	1,69
	25-39	1,70	0,78	2,06*	2,42*	1,98
	40-59	0,31	0,46	0,59	0,88	0,64
	60-64	0,19	0,00	0,00	0,00	0,05
	Gesamt	**-**	9728	9981	8088	8334
Neue psychoaktive Substanzen (NpS)	18-64	-	0,88*	0,93*	1,31*	0,81
	18-24	-	1,38	2,22	3,37	2,92
	25-39	-	0,90	1,01	1,23*	0,79
	40-59	-	0,76*	0,61*	0,89*	0,48
	60-64	-	0,77	0,59	1,051	0,00
	Gesamt	9046	9195	9264	9008	7508
Inhalanzien	18-64	0,32	0,14*	0,20*	0,31*	0,66
	18-24	0,43*	0,18*	0,60*	0,27*	1,67
	25-39	0,34	0,03*	0,30*	0,38*	0,91
	40-59	0,32	0,23	0,08	0,36	0,22
	60-64	0,12	0,00	0,00	0,00	0,66
	Gesamt	9047	9198	9267	9002	7507
Halluzinogene Pilze	18-64	0,33	0,37	0,39	0,55	0,49
	18-24	0,56	1,50	1,50	1,93	1,49
	25-39	0,59	0,05*	0,48	0,60	0,70
	40-59	0,18	0,34*	0,10	0,28	0,21
	60-64	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00

[1)] MDMA (“Ecstasy”), Amphetamine, Methamphetamin, Kokain, Crack, LSD, halluzinogene Pilze, Schnüffelstoffe, Heroin, andere Opioide, NpS

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 8: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	**Erhebungsjahr**				
		2012	**2015**	**2018**	**2021**	**2024**
Irgendeine illegale Droge [1)]	***n***	**9062**	**9204**	**9267**	**9030**	**7508**
	Gesamt	1,60*	2,35	3,07	3,78	3,72
	Männer	2,32*	2,74	3,66	4,65	4,63
	Frauen	0,85*	1,96	2,46	2,90	2,75
Amphetamin/ Methamphetamin	***n***	**9047**	**9201**	**9267**	**9008**	**7508**
	Gesamt	0,74	1,04*	1,22*	1,40*	0,74
	Männer	1,19*	1,24*	1,56*	1,52*	0,89
	Frauen	0,28	0,83*	0,87*	1,29*	0,53
Amphetamin	***n***	**9047**	**9185**	**9265**	**8997**	**7508**
	Gesamt	0,74	1,00*	1,20*	1,38*	0,74
	Männer	1,19*	1,22*	1,54*	1,47*	0,89
	Frauen	0,28	0,78*	0,86*	1,29*	0,52
Methamphetamin	***n***	-	**9164**	**9162**	**9008**	**7508**
	Gesamt	-	0,21*	0,21*	0,24*	0,04
	Männer	-	0,19*	0,34*	0,23*	0,01
	Frauen	-	0,23*	0,08	0,25*	0,01
MDMA ("Ecstasy")	***n***	**9046**	**9181**	**9267**	**8995**	**7508**
	Gesamt	0,45*	0,64	1,07*	1,02	1,04
	Männer	0,74	0,72	1,17	1,36	1,34
	Frauen	0,15*	0,57	0,97*	0,67	0,73
LSD	***n***	**9044**	**9178**	**9266**	**9000**	**7508**
	Gesamt	0,27*	0,27*	0,31	0,64	0,69
	Männer	0,46	0,24*	0,49	0,82	0,95
	Frauen	0,08*	0,29	0,14	0,45	0,36
Heroin und andere Opioide	***n***	**9042**	**9180**	**9267**	**9010**	**7508**
	Gesamt	0,37*	0,33*	0,44	0,55	0,75
	Männer	0,42	0,30	0,48	0,64	0,60
	Frauen	0,32*	0,36*	0,39*	0,45*	0,85
Kokain/Crack	***n***	**9044**	**9177**	**9267**	**9001**	**7508**
	Gesamt	0,78	0,63	1,11	1,57*	1,12
	Männer	1,27	0,79	1,40	2,06*	1,43
	Frauen	0,27*	0,48	0,82	1,07*	0,74
Neue psychoaktive Substanzen (NpS)	***n***	-	9149	9195	9027	7507
	Gesamt	-	0,88*	0,30	1,31*	0,81
	Männer	-	0,85	1,05*	1,46*	1,00
	Frauen	-	0,90*	0,80*	1,16*	0,56
Inhalanzien	***n***	9046	9195	9264	9008	7508
	Gesamt	0,32	0,14*	0,20*	0,31*	0,17
	Männer	0,47	0,25*	0,38	0,41*	0,26

	Frauen	0,16	0,04*	0,02*	0,22	0,09
Halluzinogene Pilze	***n***	9047	9198	9267	9002	7507
	Gesamt	0,33	0,37	0,39	0,55	0,49
	Männer	0,54	0,43	0,56	0,70	0,64
	Frauen	0,01	0,30	0,22	0,39	0,33

[1)] MDMA (“Ecstasy”), Amphetamine, Methamphetamin, Kokain, Crack, LSD, halluzinogene Pilze, Schnüffelstoffe, Heroin, andere Opioide, NpS

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 9: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Irgendeine illegale Droge [1)]	**Gesamt**	**9063**	**9202**	**9267**	**9030**	**7508**
	18-64	0,95	0,85	1,07	1,66*	1,29
	18-24	1,28	2,14	2,86	2,88	2,28
	25-39	1,71	1,15	1,40	2,36*	1,73
	40-59	0,56	0,51	0,55	1,24*	0,82
	60-64	0,36	0,00	0,37	0,12	0,88
Amphetamin/ Methamphetamin	**Gesamt**	**9051**	**9201**	**9265**	**9008**	**7508**
	18-64	0,39*	0,54*	0,53*	0,68*	0,31
	18-24	0,59	1,17	1,83*	1,25	0,77
	25-39	0,72	0,79*	0,87*	1,17*	0,41
	40-59	0,22	0,35*	0,10	0,36	0,20
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
Amphetamin	**Gesamt**	**9051**	**9189**	**9265**	**8997**	**7508**
	18-64	0,39*	0,54*	0,53*	0,68*	0,31
	18-24	0,59	1,17	1,83*	1,25	0,77
	25-39	0,72	0,79*	0,87*	1,17*	0,41
	40-59	0,22	0,35*	0,10	0,36	0,20
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
Methamphetamin	**Gesamt**	**-**	**9172**	**-**	**9008**	**7508**
	18-64	-	0,06	-	0,14	0,00
	18-24	-	0,00	-	0,18	0,00
	25-39	-	0,05	-	0,18	0,00
	40-59	-	0,09	-	0,14	0,00
	60-64	-	0,00	-	0,00	0,00
MDMA ("Ecstasy")	**Gesamt**	**9048**	**9186**	**9267**	**8997**	**7506**
	18-64	0,22	0,21	0,30*	0,35*	0,22
	18-24	0,24	0,85	0,92	0,86	0,28
	25-39	0,40	0,14	0,52	0,56	0,48
	40-59	0,15	0,13	0,07	0,17	0,07
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LSD	**Gesamt**	**9049**	**9184**	**9266**	**9001**	**7508**
	18-64	0,09	0,03*	0,06	0,20	0,16
	18-24	0,23	0,14	0,09	0,82	0,17
	25-39	0,13	0,00	0,05	0,11	0,28
	40-59	0,06	0,02	0,05	0,14	0,11
	60-64	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
Heroin und andere Opioide	**Gesamt**	**9047**	**9185**	**9267**	**9010**	**7508**
	18-64	0,27	0,18	0,16	0,29	0,24

	18-24	0,00	0,27	0,40	0,24	0,04
	25-39	0,6	0,22	0,16	0,26	0,22
	40-59	0,19	0,18	0,10	0,37*	0,16
	60-64	0,05	0,00	0,19	0,09	0,73
Kokain/Crack	**Gesamt**	**9049**	**9183**	**9267**	**8999**	**7507**
	18-64	0,28	0,16	0,33	0,58*	0,32
	18-24	0,29	0,72	0,62	0,89	0,18
	25-39	0,49	0,17	0,49	0,78	0,65
	40-59	0,17	0,05	0,23	0,51*	0,20
	60-64	0,19	0,00	0,00	0,00	0,02
Neue psychoaktive Substanzen (NpS)	**Gesamt**	**-**	**9184**	**9266**	**9001**	**7508**
	18-64	-	0,04*	0,07	0,19	0,20
	18-24	-	0,07	0,27	0,35	0,44
	25-39	-	0,05	0,07	0,08	0,28
	40-59	-	0,02	0,04	0,27	0,14
	60-64	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Inhalanzien	**Gesamt**	**9047**	**9185**	**9267**	**9010**	**7508**
	18-64	0,24*	0,06	0,11	0,18	0,17
	18-24	0,23	0,08	0,37	0,07	0,24
	25-39	0,13	0,00	0,09	0,08	0,28
	40-59	0,32*	0,11	0,08	0,33*	0,09
	60-64	0,12*	0,00	0,00	0,00	0,13
Halluzinogene Pilze	**Gesamt**	**1085**	**948**	**959**	**936**	**859**
	18-64	0,13	0,04	0,08	0,12	0,15
	18-24	0,18	0,20	0,14	0,19	0,62
	25-39	0,11	0,00	0,10	0,07	0,16
	40-59	0,15	0,02	0,03	0,16	0,05
	60-64	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00

[1)] MDMA (“Ecstasy”), Amphetamine, Methamphetamin, Kokain, Crack, LSD, halluzinogene Pilze, Schnüffelstoffe, Heroin, andere Opioide, NpS

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 10: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	**Erhebungsjahr**				
		2012	**2015**	**2018**	**2021**	**2024**
Irgendeine illegale Droge [1)]	***n***	**9063**	**9202**	**9267**	**9030**	**7508**
	Gesamt	0,95	0,85	1,07	1,65*	1,29
	Männer	1,31	1,05	1,36	2,11*	1,48
	Frauen	0,58	0,64	0,78	1,19	1,04
Amphetamin/ Methamphetamin	***n***	**9051**	**9201**	**9265**	**9008**	**7508**
	Gesamt	0,39*	0,54*	0,53*	0,68*	0,31
	Männer	0,65*	0,55*	0,66*	0,68*	0,28
	Frauen	0,11	0,53*	0,41	0,68*	0,29
Amphetamin	***n***	**9051**	**9189**	**9265**	**8997**	**7508**
	Gesamt	0,39*	0,54*	0,53*	0,68*	0,31
	Männer	0,65*	0,55*	0,66*	0,68*	0,28
	Frauen	0,11	0,53*	0,41	0,68*	0,29
Methamphetamin	***n***	**-**	**9172**	**-**	**9008**	**7508**
	Gesamt	-	0,06	-	0,14	0,00
	Männer	-	0,00	-	0,04	0,00
	Frauen	-	0,11	-	0,25	0,00
MDMA ("Ecstasy")	***n***	**9048**	**9186**	**9267**	**8997**	**7506**
	Gesamt	0,22	0,21	0,30*	0,35*	0,22
	Männer	0,40	0,21	0,35	0,44	0,31
	Frauen	0,02	0,21	0,26*	0,26	0,12
LSD	***n***	**9049**	**9184**	**9266**	**9001**	**7508**
	Gesamt	0,09	0,03*	0,06	0,20	0,16
	Männer	0,16	0,05	0,11	0,20	0,23
	Frauen	0,03	0,01	0,00	0,19	0,08
Heroin und andere Opioide	***n***	**9047**	**9185**	**9267**	**9010**	**7508**
	Gesamt	0,27	0,18	0,16	0,29	0,23
	Männer	0,29*	0,22*	0,18*	0,23*	0,07
	Frauen	0,25	0,14*	0,14*	0,36	0,41
Kokain/Crack	***n***	**9049**	**9183**	**9267**	**8999**	**7507**
	Gesamt	0,28	0,16	0,33	0,58*	0,32
	Männer	0,40	0,17	0,43	0,79*	0,46
	Frauen	0,15	0,15	0,23	0,37	0,17
Neue psychoaktive Substanzen (NpS)	***n***	-	9183	9267	8986	7473
	Gesamt	-	0,06*	0,07	0,19	0,20
	Männer	-	0,04	0,12	0,16	0,22
	Frauen	-	0,03	0,02	0,22	0,13
Inhalanzien	***n***	9053	9200	9266	8994	7474
	Gesamt	0,26*	0,06	0,11	0,18	0,17
	Männer	0,34	0,10	0,21	0,23	0,26

	Frauen	0,13	0,02	0,00	0,13	0,09
Halluzinogene Pilze	***n***	9049	9200	9267	8991	7473
	Gesamt	0,13	0,04	0,08	0,12	0,15
	Männer	0,25	0,03*	0,11	0,10	0,24
	Frauen	0,00	0,04	0,04	0,13	0,05

[1)] Ecstasy, Amphetamine, Methamphetamin, Kokain, Crack, LSD, halluzinogene Pilze, Schnüffelstoffe, Heroin, andere Opioide, NpS
* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.
-) wurde nicht erhoben.
Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 11: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von Amphetamin nach DSM-IV[1)] (18- bis 64-Jährige), 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Erhebungsjahr		
	2012	**2018**	**2024**
Gesamt (n)	**9055**	**9263**	**7495**
Missbrauch	0,17*	0,11	0,07
Abhängigkeit	0,13	0,22*	0,14
Männer (n)	**3918**	**4179**	**3218**
Missbrauch	0,29*	0,14	0,08
Abhängigkeit	0,22	0,24	0,21
Frauen (n)	**5137**	**5084**	**4243**
Missbrauch	0,05	0,08	0,01
Abhängigkeit	0,03	0,21*	0,07

DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.
* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.
Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 12: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV[1)] (18- bis 64-Jährige), 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Erhebungsjahr		
	2012	**2018**	**2024**
Gesamt (n)	**9055**	**9264**	**7496**
Missbrauch	0,01	0,11	0,09
Abhängigkeit	0,20	0,08	0,12
Männer (n)	**3918**	**4179**	**3218**
Missbrauch	0,03	0,21	0,13
Abhängigkeit	0,33*	0,11	0,13
Frauen (n)	**5137**	**5085**	**4244**
Missbrauch	0,00	0,01	0,05
Abhängigkeit	0,06	0,04	0,11

[1)] DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.
* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.
Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 13: Trends des Missbrauchs und der Abhängigkeit von Amphetamin nach DSM-IV[1)] (18- bis 64-Jährige), 2012-2024 (Prozent) (Konsumierende von Amphetamin in den letzten 30 Tagen)

	Erhebungsjahr		
	2012	**2018**	**2024**
Gesamt (n)	**59**	**122**	**72**
Missbrauch	23,5	9,4	9,1
Abhängigkeit	16,9	19,0	23,6
Männer (n)	**41**	**65**	**39**
Missbrauch	24,8	9,6	6,5
Abhängigkeit	18,7	15,7	26,6
Frauen (n)	**-**	**57**	**30**
Missbrauch	-	9,1	2,1
Abhängigkeit	-	25,1	19,6

[1)] DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.
* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.
Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.
-) n < 30

Tabelle 14: Trends des Missbrauchs und der Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV[1)] (18- bis 64-Jährige), 2012-2024 (Prozent) (Konsumierende)

	Erhebungsjahr		
	2012	**2018**	**2024**
Gesamt (n)	**53**	**104**	**120**
Missbrauch	1,7	10,3	8,8
Abhängigkeit	25,4	7,2	11,9
Männer (n)	**37**	**55**	**65**
Missbrauch	2,0	15,3	10,0
Abhängigkeit	26,0	8,1	9,8
Frauen (n)	**-**	**49**	**54**
Missbrauch	-	1,7	7,2
Abhängigkeit	-	5,5	17,2

[1)] DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.
* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.
Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.
-) n < 30